



ACHTUNG!

AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST

DIE AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST (ASP) ZÄHLT ZU DEN GEFÄHRlichsten TIERSEUCHEN UND BREITET SICH SEIT 2014 IN GROSSEN TEILEN OSTEUROPAS IN DER WILDSCHWEINPOPULATION AUS. MITTLERWEILE HAT DIESE SEUCHE DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK ERREICHT UND IST NUR MEHR 80 KM VON DER ÖSTERREICHISCHEN STAATSGRENZE ENTFERNT. NOCH IST IN ÖSTERREICH KEIN FALL AUFGETRETEN, DAS RISIKO EINER EINSCHLEPPUNG NACH ÖSTERREICH IST ABER SEHR HOCH.

SEUCHENBEKÄMPFUNG

Für die Seuchenbekämpfung ist es von großer Bedeutung, dass ein allfälliges Auftreten in Österreich möglichst frühzeitig erkannt wird, und dass alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, die eine Einschleppung in heimische Schweinebetriebe verhindern. **Beschäftigte in der Forstwirtschaft können dabei einen sehr wichtigen Beitrag leisten!**


- Bei Wildschweinen verläuft die Krankheit fast immer tödlich. In den ausgewiesenen Risikogebieten (www.verbrauchergesundheit.gv.at) sind alle tot aufgefundene und krankheitsverdächtige Wildschweine immer dem **Amtstierarzt** zu melden. Auch bei bereits stark verwesenen Kadavern ist noch eine Untersuchung auf diese Tierseuche möglich. Den Kadaver dürfen nicht von der Fundstelle entfernt werden.
- Außerhalb der **Risikogebiete** informieren Sie die lokale Veterinärbehörde wenn Sie tote Wildschweine in gehäufter Anzahl finden, oder wenn krankheitsverdächtige Anzeichen vorliegen (Abmagerung, Blutungen aus Körperöffnungen) Ebenso melden Sie bitte verhaltensauffällige Tiere (apathisch, orientierungslos, verringerte Fluchtbereitschaft).
- Bei der Meldung an den Amtstierarzt bitte möglichst genau den **Fund-/Sichtungsort** angeben, optimal wäre die Angabe von Geokoordinaten (entsprechende Apps können auf Smartphones installiert werden).
- Aufgrund der hohen **Widerstandsfähigkeit des Virus** stellen Schweinefleischprodukte ein großes Risiko für die Einschleppung der ASP dar.
- Durch Verfütterung illegal importierter, aus Schweinefleisch hergestellter Lebensmittel aus Ausbruchsgebieten können sich gesunde Schweine anstecken. **Entsorgen Sie Speisereste immer „wildschweinsicher“** in verschlossenen Behältnissen, besondere Vorsicht ist bei importierten Lebensmitteln geboten (z. B. Rohwürste aus Hausschlachtung)!
- Wenn Sie selbst Schweinehalter sind: **Reinigen Sie Kleidung, Schuhe und Ausrüstung** die im Wald getragen wurde gründlich – das ASP Virus ist sehr widerstandsfähig und kann z. B. über schmutzige Stiefel übertragen werden. Verwenden Sie jedenfalls eigene Stallkleidung und Stiefel!
- Nach Kontakt mit (toten) Wildschweinen: gründliche Reinigung der Ausrüstung mit Spülmittel und heißem Wasser, anschließend Desinfektionsmittel verwenden. Kleidung mit herkömmlichem Waschmittel wenn möglich bei 70 °C waschen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt mit Hausschweinen.
- **Hunde können nicht an ASP erkranken**, die Krankheit allerdings über Schmutz auf Schweine übertragen. **Für den Menschen besteht kein Gesundheitsrisiko!**



ÜBERTRAGUNGSWEGE

DIE AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST KANN DURCH 3 VERSCHIEDENE ABLÄUFE ÜBERTRAGEN WERDEN:

1 Wildschwein frisst Lebensmittelabfälle



2 Übertragung durch Kadaver



3 Lebensmittel aus Risikogebieten



APA Infografik

